

# 実のりお買得情報!



- ☆ビニール温室、苗ぼうし等保温資材各種販売中!!
- ☆米収穫用品、玄米保冷库等各種販売中!!
- ☆パンジー、ピオラ、ガーデンシクラメンなど花苗各種販売中!!
- ☆いちご苗、果樹苗各種販売中!!
- ☆玉ねぎ苗各種好評販売中!!

平成26年11月号

# 実のり新聞

平成26年11月・第200号(毎月発行)

## <実のり新聞創刊200号>

今月11月号におきまして、実のり新聞は創刊200号を迎えることができました。誠にありがとうございます。裏面にて特集記事を掲載しております。ひとえにお客様のおかげと感謝いたしております。これからもタイム、実のり各店、実のり新聞をよろしくお願いたします。

## <竹防除特集!!!>

毎年除草が大変で、よく相談を承る竹の除草について今月は特集してみたいと思います。

竹は、イネ科の植物で、温暖で湿潤な環境が大好きです。日本から南アジアにかけて多く生育し、日本では特に九州から中四国で多く生育しています。また、日本では主に三大竹といわれるモウソウチク、マダケ、ハチクが繁殖しています。

通常、竹は地下茎を広げることで繁殖域を拡大していきます。成長力が非常に強くわずか2~3か月で高さが10~20mにもなり成長するのにあまり空間や光を必要としないという特徴があります。

(モウソウチク): 日本の竹の中で最大です。高さ約25m、地下茎は約15mにも成長します。タケノコは食用になり、茎は竹細工に使われます。

(マダケ): 高さ約20mに成長し、太く長い地下茎を地面に張り巡らせます。稈は弾力性があり楽器や建材に利用されます。

(ハチク): 直径は3~10cm、高さは10~15m位でモウソウチク、マダケについて多く分布しています。

### 防除対策:

① 地下茎が貫通しない素材(トタン板等)を埋設することで竹の侵入を防ぐ方法も有効とされています。深さ50cm位の溝を掘り、トタン板などを設置します。ただしトタン板の定期的な維持管理、つなぎ目をなくして設置する工夫等が必要になります。

② 除草剤の散布として有効な薬剤は次の2種類になります。

#### 1、ラウンドアップマックスロードによる

6~11月にかけて、原液10mlをドリルなどで穴をあけた竹稈に注入します。穴をガムテープなどでしっかりフタをします。1~2か月後葉が変色しはじめて、落葉していきます。2~5か月後落葉により光合成できなくなれば根まで枯れていきます。8~10か月後完全に枯れ、乾燥もしくは腐食状態になります。

\* 根まで枯らした竹は、不安定になり、倒れてくる可能性があります。

\* ラウンドアップを注入した竹から15m以内に発生したたけのこはたべられません。他人が採取しないように注意することもひつようです。

#### 2、クロレートS粒剤による

3~5月、10月が最適の散布時期になります。10アール当たり45~60kgを一回のみ散布してください。(劇物農薬により購入時、印鑑と身分証明書の提示が必要になります。)



営業時間/9:00~20:00

実のり山陽店

Tel (086) 955-5561  
岡山県赤磐市上市180-1

営業時間/9:00~20:00

実のり玉島店

Tel (086) 523-0511  
岡山県倉敷市玉島爪崎1057-1

営業時間/9:00~20:00

実のり大安寺店

Tel (086) 214-2338  
岡山県岡山市北区野殿西町418-1

営業時間/9:00~20:00

実のり伊予三島店

Tel (0896) 23-0600  
愛媛県四国中央市下柏町688

営業時間/9:00~20:00

実のり長船店

Tel (0869) 26-8820  
岡山県瀬戸内市長船町福岡1164-1

Time  
HOME CENTER

実のり  
農家の店