

# 実のりお買得情報!



- ☆アゼシート・育苗箱など水稻資材大量販売中!!
- ☆水稻農薬各種販売中!!
- ☆桃袋等、出荷用品大量販売中!!
- ☆さつまいも苗続々入荷中!!
- ☆春蒔き野菜・お花の種各種販売中!!

## 水稻問題雑草特集第二弾!!

水田に発生する雑草は、一年生雑草と、多年生雑草の二つに大きく分類されます。一年生雑草は種子で繁殖しますが、多年生雑草は種子以外にも塊茎、鱗系、匍枝などの栄養繁殖器官で繁殖します。多年生雑草は、一年生雑草に比べ、一定面積当たりの発生個体数は少ないものの生育が旺盛です。また、貯蔵養分が多く再生能力が高いのも特徴です。また、発生深度が深く、複数の芽を持ち、長期間発生し続けるといった特徴があり、除草剤を利用しても防除が困難なことがあります。代表的なものにオモダカ、クログアイ、コウキヤガラ、シズイなどがあり、難防除雑草とか、問題雑草とかとされています。これらの雑草の生態と防除のポイント、除草剤の有効利用と使用時の注意点をまとめてみました。

**オモダカ**・・・全国に発生が見られ、種子からも発生する場合がある。

塊茎から発生する場合はほとんど。

土中での塊茎生存期間は1~2年程度と短い。

発生後早い時期はコナギに似た葉だが、その後抽出する矢尻状の葉が特徴的。

SU系除草剤に抵抗性を示すタイプが出現し、防除の確立が必要。

**クログアイ**・・・深さ30cm以上の土中からも発生する。

塊茎には、数個の芽があり、萌芽した芽が除草剤で枯死しても別の芽が生育する。

生育初期は細い針金状の芽を抽出し、ホタルイに似ている。

秋に塊茎を形成して翌年以降の発生源になる。

**コウキヤガラ**・・・沿岸に近い湿地や干拓地に多い。

地域によっては、代かき前後の早い時期から発生する。

夏から秋に根茎の先端に塊茎を形成する。

**シズイ**・・・山間部に多く発生する。

土中のやや深い所からも発生する。

発生期間が長く小さな塊茎を大量に生産する。

塊茎が小さいため、用水路などから水田に侵入することもある。

土中での塊茎の寿命は1年程度。

# 実のり新聞

平成27年5月号

平成27年5月・第206号(毎月発行)

営業時間/8:00~20:00

**実のり山陽店**

Tel (086) 955-5561  
岡山県赤磐市上市180-1

営業時間/8:00~20:00

**実のり玉島店**

Tel (086) 523-0511  
岡山県倉敷市玉島爪崎1057-1

営業時間/9:00~20:00

**実のり大安寺店**

Tel (086) 214-2338  
岡山県岡山市北区野殿西町418-1

営業時間/8:00~20:00

**実のり伊予三島店**

Tel (0896) 23-0600  
愛媛県四国中央市下柏町688

営業時間/9:00~20:00

**実のり長船店**

Tel (0869) 26-8820  
岡山県瀬戸内市長船町福岡1164-1

**Time**  
HOME CENTER

**実のり**  
農家の店