


# 夏の風物詩「スイカ」


## 高血圧や尿路結石の予防に



▲スイカ苗の摘心場所と交配および着果場所のイメージ図

【手順①】苗を植える約2週間前に苦土石灰を100g/m<sup>2</sup>と牛糞堆肥を3kg/m<sup>2</sup>入れてよく耕し、1週間前に有機配合肥料100g/m<sup>2</sup>を入れて畝を作っておきます【手順②】株間は2mは確保してほし。2mおきに苗を植えたら、水をたっぷりあげます【手順③】摘心の方法は3〜4本伸ばして孫づるを摘みましよう。このとき有機配合肥料を50〜60g/m<sup>2</sup>追肥しましよ。1番目の果実は変形したり、大きくならなかつたりするので採ってしまいましよう。子づるの12〜20節に咲いた雌花に雄花の花粉をつけて交配させます。この交配作業は朝9時くらいまでに行ないましよう。18節前後に着果させると最も良い果実が採れます。1株当たりの着果数の目安は次の通り。子づる3本の場合は大玉種で1個小玉種で2個、また子づる4本の場合は大玉種で2個、小玉種で3個まで

【手順④】実が着いたら株のまわりに有機配合肥料を50〜60g/m<sup>2</sup>追肥して水を与えます【手順⑤】実の大きさが野球ボールくらになつたら、つるが上になるように置きます。2週間に1回くらい実を横向きにしたり、反対向きにしたにして、最後に上になるように置きます【手順⑥】品種によって異なりますが、花が咲いてから約30〜50日後が収穫どきです。



人工授粉とは雄花の花粉を雌花に直接つける作業のことである。花粉は急激に受精能力が低下するので、人工授粉は早朝に行なうことが大切である。それから、一番初めに出来た実は、株が十分に育つ前につきまますから、変形したり大きくならなかつたりします。よって一番初めに出来た実は取るようにします。15〜18節目についた雌花に実をつけさせるのが良いと言われています。

夏の風物詩には欠かせない野菜のひとつスイカ採りたての甘さとみずみずしさは格別です。スイカは連作を極端に嫌うので、一度栽培したら5年間は同じ場所での栽培はしないことが大切です。

スイカは南アフリカが原産地であるため、高い気温と乾燥した空気、そして日光は好きである。気温は20〜30℃くらいのときによく育ちます

【栽培ガイド】スイカは南アフリカが原産地であるため、高い気温と乾燥した空気、そして日光は好きである。気温は20〜30℃くらいのときによく育ちます

人工交配したら日付けを記載したラベルを貼っておきましよう。交配日から小玉種で35日前後、大玉種で40日前後が収穫の目安とされています。そのほか収穫の目安として、①果実の肩の張りが良くなり、花落ち部分が凹む。②若い艶(つや)がなくなり、光沢が鈍くなる。③果実の付いている節から出た巻きひげが枯れてくる。などがある

【病害虫対策】炭そ病 本病気の特徴としては、葉・茎および果実に発病します。葉には円形ないし不正形かつ暗褐色の病斑を生じ、茎には紡錘形で中央部の凹んだ病斑を生じます。果実でははじめ暗緑色かつ水浸状の病斑を生じ、のちに病斑は凹み、ときには亀裂を生じます。胞子は雨によって飛散します

【ウリハムシ】本害虫は日中、黄橙色の小さな甲虫が葉上に群がって食害し、特有の円形の食痕が見られます。発生が多いと丸坊主にされることもあり、幼苗では著しく生育が阻害されます。成虫は4月頃から食害し、産卵を始めます。新成虫は7月下旬から8月にかけて現れます。防除方法としては、成虫の飛来と食害を防止しあわせて産卵を防ぐために成虫発生期には定期的な薬剤散布を実施しましよ。適用薬剤としてはマラソン乳剤がおすすめ。希釈倍率1000倍で収穫前日まで3回散布しましよ。

【ウリハムシ】本害虫は日中、黄橙色の小さな甲虫が葉上に群がって食害し、特有の円形の食痕が見られます。発生が多いと丸坊主にされることもあり、幼苗では著しく生育が阻害されます。成虫は4月頃から食害し、産卵を始めます。新成虫は7月下旬から8月にかけて現れます。防除方法としては、成虫の飛来と食害を防止しあわせて産卵を防ぐために成虫発生期には定期的な薬剤散布を実施しましよ。適用薬剤としてはマラソン乳剤がおすすめ。希釈倍率1000倍で収穫前日まで3回散布しましよ。

【ワタアブラムシ】葉裏や新芽に黒っぽいアブラムシが群生し、吸汁加害するため葉が巻き上がったり、展開が阻害されたりします。適用薬剤としては、モスピラン水和剤を2000〜4000倍で収穫の前日まで3回散布しましよ。

【ワタアブラムシ】葉裏や新芽に黒っぽいアブラムシが群生し、吸汁加害するため葉が巻き上がったり、展開が阻害されたりします。適用薬剤としては、モスピラン水和剤を2000〜4000倍で収穫の前日まで3回散布しましよ。

【ワタアブラムシ】葉裏や新芽に黒っぽいアブラムシが群生し、吸汁加害のため葉が巻き上がったり、展開が阻害されたりします。適用薬剤としては、モスピラン水和剤を2000〜4000倍で収穫の前日まで3回散布しましよ。

### タイムポイントカード入会者募集中!!

ポイントカードは特典がいっぱいです。初回100円の入会料のみで年会費不要。クレジット機能無しで安心。105円のお買い物で1ポイント貯まり、500ポイント毎にレジで500円単位でご利用できます。詳しくはサービスカウンターまでお問い合わせ下さいませ。

### 機械修理専門スタッフ募集中!!

エンジン刈払機や耕運機など機械を直すのが大好きな方を大募集!年齢・経験は問いません。まずはお気軽に下記までご連絡下さい。【TEL】: 086-955-3411

### タイム・実のりメール会員募集中

time@c-brain.com 上記アドレスに空メールを送って下さい。返信メールのアドレスにアクセスして登録を行なって下さい。

