

タイム野菜種ランキンング

人気一位は

次郎丸ほうれん草

丈夫で作りやすく美味豊産種



つる有

スナックエンドウ

うまい・さやごとく
食べる新品種



河内一寸そら豆

豆の大きさ3cm
位の大粒種



ソロモン法蓮草

アトラスよりさらに
強い耐病性の豊産種



つるなし

スナックエンドウ

簡単な支柱で作れる
新品種



絹さやえんどう

作って便利収穫が
楽しい



大葉しゅんぎく

風味良く作りやすい



中国野菜

チンゲンサイ
作りやすく美味
家庭菜園に最適



まろやか風味

こまつな

おひたし漬物に
いつでも重宝



赤花つる有

絹さや

えんどう
作りやすく
莢つぎの良い豊産種



野菜の連作障害にご注意

連作とは

毎年、同じ場所に同じ野菜(あるいは同じ科の野菜)を栽培することを連作といいます。そうすると、その野菜を冒す病原菌や有害線虫(ネマトーダ)が多くなったり、土壌の中の養分が不足したりして、野菜の生育が悪くなります。これを連作障害といいます。とくにナス科やウリ科、マメ科、それにアブラナ科の野菜は連作障害を起こすので、注意が必要です。

豆・アブラナ科連作障害

豆・アブラナ科を連作したときに現れる連作障害の内容を示したのが、つぎの表です。さまざまな病気や有害線虫が発生します。



科名	種類	連作障害
マメ	えんどう	立ち枯れ病
アブラナ	はくさい	根瘤(ねこぶ)病
	こまつな	根瘤(ねこぶ)病
	キャベツ	根瘤(ねこぶ)病

豆・アブラナ科の作付け間隔

野菜の連作障害を防ぐには、ひとつの野菜を同じ場所に栽培しないことです。連作を嫌うおもな野菜の作付け間隔(休耕年限)の目安を示したのが、つぎの表です。

科名	種類	作付け間隔(年)									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
マメ	えんどう	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	そらまめ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	いんげんまめ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	えだまめ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	らっかせい	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
アブラナ	カリフラワー	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	はくさい	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	キャベツ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	こまつな	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	かぶ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■




連作障害を防ぐには

連作障害を防ぐ対策としては、とりあえず近縁の野菜を続けてつづらないことです。それか、休耕期の土壌の天地返しや、薬剤による消毒を行います。

○輪作
ホームガーデンを4〜5区画に分けて、栽培する野菜を毎年回転させていきます。

○天地返え
冬の休耕期に、表土と地表から30センチほどの土壌を入れ替え、堆肥をじゅうぶんに施します。

○消毒
薬剤による消毒や太陽光による消毒があります。



分類	後作によい	前作	後作にわるい
種名	キャベツ	トマト	なす
	ブロッコリー		きゅうり
	ねぎ		ピーマン じゃがいも
	かぼちゃ	なす	トマト
	えだまめ		ピーマン
	とうもろこし		じゃがいも
	ささげ		とうがらし
	とうもろこし	きゅうり	だいこん
	たまねぎ		かぼちゃ
	ほうれんそう		にんじん
	えんどう	だいこん	にんじん
	えだまめ		すいか
	わけぎ		きゅうり
	ねぎ		ごぼう
	トマト		ねぎ
	キャベツ	たまねぎ	わけぎ
だいこん	えんどう		
すいか			
はくさい	にんじん	トマト	
たまねぎ		きゅうり	
キャベツ			
トマト	とうもろこし	にんじん	
はくさい		だいこん	
ブロッコリー			
えんどう			

連作障害について

(参照・引用: (株)アタリヤ農園ホームページ)

玉葱予約販売実施中!!

予約販売期間 9/16(水曜日)~10/18(日曜日)まで

※詳しくは係員までお訊ね下さい。

機械修理専門スタッフ募集中!!

エンジン刈払機や耕運機など機械を直すのが大好きな方を大募集! 年齢・経験は問いません。まずはお気軽に下記までご連絡下さい。
【TEL】: 086-955-3411

タイム・実のりメール会員募集中

time@c-brain.com
上記アドレスに空メールを送って下さい。返信メールのアドレスにアクセスして登録を行なって下さい。

